Gentax®-*ótico*

Gentamicina
Betametasona y
Clotrimazol

Perros

Para el tratamiento de otitis externa,aguda o crónicaen perros, los Veterinarios recomiendan **Gentax®-*ótico***,*producto desarrollado por* **INVET** *con la composición ideal para actuar en forma simultánea como bactericida, antiinflamatorio y antimicótico.*

DESCRIPCIÓN

Gentax®-*ótico* es un ungüento fluido formado por una base especial oleosa que permite el contacto prolongado del producto para asegurar la acción terapéutica de todos sus componentes.

COMPOSICIÓN

Cada gramo contiene

Gentamicina (como sulfato)	3 mg
Betametasona valerato	1 mg
Clotrimazol	10 mg
Excipientes c.s.p.	1 g

DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Gentamicina es un antibiótico de amplio espectro, perteneciente al grupo de los aminoglucósidos. Constituye un tratamiento tópico muy eficaz contra infecciones bacterianas óticas y dérmicas. Actúa contra bacterias gram positivas y gram negativas, especialmente: *Alcaligenes* spp., *Citrobacter* spp., *Klebsiella* spp., *Pseudomona aeruginosa, Proteus* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. y *Escherichia coli.,* entre otras.

Betametasona es un derivado adrenocorticoide sintético de la Prednisolona que ha demostrado su actividad antiinflamatoria y antiprurítica en el tratamiento tópico de la otitis externa y en lesiones superficiales infectadas en perros. En los casos susceptibles, la actividad local antiinflamatoria es coadyuvada por las propiedades vasoconstrictoras del esteroide.

Clotrimazol es un agente antifúngico de amplio espectro empleado en el tratamiento de enfermedades de la piel causadas por varias especies de dermatofitos patógenos y levaduras. Su acción primaria está dirigida contra la división y el crecimiento del organismo causante. Es absorbido por la piel.

In vitro demuestra una acción fungistática y fungicida contra *Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Candida* spp. y *Malassezia pachydermatis.*
Es poco frecuente la resistencia al Clotrimazol por hongos causantes de micosis superficiales.

Reg. ICA 3927 DB
Ecuador: 2C6-8981-AGROCALIDAD
Panamá: RF - 2351 - 02 MIDA
Costa Rica: MAG # CO22-41-4-5131
INVET S.A.,COLOMBIA
www.invetcolombia.com

DEL PRODUCTO

Gentax®-*ótico* es un ungüento fluido a base de un excipiente oleoso especial que asegura una acción antibacterial, antiinflamatoria y antifúngica, en virtud de sus componentes, lo cual lo convierte en el producto ideal para obtener un rápido y efectivo tratamiento de la otitis externa.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil y práctica administración.
- Excipiente especial que asegura la acción terapéutica.
- Acción antibacterial, antiinflamatoria y antifúngica.
- Rápida y excelente resolución de síntomas primarios: inflamación, dolor, prurito y eritema.
- Tratamiento rápido y eficaz de la otitis externa.

INDICACIONES Y USOS

Gentax®-*ótico* está indicado en el tratamiento de otitis externa aguda o crónica en perros, provocada por gérmenes sensibles a la Gentamicina, en especial *Alcaligenes* spp., *Citrobacter* spp., *Klebsiella* spp., *Pseudomona aeruginosa, Proteus* spp., *Escherichia coli, Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.; y por hongos y levaduras controlados por la acción del Clotrimazol, tales como *Candida* spp. *Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis* y *Malassezia pachydermatis.*

DOSIS

Perros hasta 15 kg de peso: Instilar 4 gotas 2 veces al día en el canal del oído.

Perros de 15 kg de peso o más: Instilar 8 gotas 2 veces al día en el canal del oído.

El tratamiento deberá durar como mínimo 7 días así la resolución de los síntomas se de en menos tiempo.

Gatos: 2 a 3 gotas 2 veces al día. No más de 7 días (puede ser tóxico).

PRESENTACIÓN

Tubo colapsible por 15 g

BIBLIOGRAFÍA

1. Chester D.K. 1988. Medical management of otitis externa. *Vet Clin North Am: Small Anim Pract.* 18(4):783-97.
2. Graham-Mize C.A, E.J. Rosser. 2004. Comparison of microbial isolates and susceptibility patterns from the external ear canal of dogs with otitis externa. *J. Am Anim Hosp Assoc.* 40:102-108.
3. Morris D.O. 2004. Medical therapy of otitis externa and otitis media. *Vet Clin North Am: Small Anim Pract.* 34(2):541-55

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario