Sosegan®

Acepromazina Maleato

Perros y Gatos

***Sosegan-gotas** es la solución ideal para tranquilizar mascotas nerviosas o agresivas en circunstancias generadoras de estrés.Ideal para el transporte de perros y gatos ya que además de tranquilizarlos actúa como antiemético. Producto desarrollado por **INVET** pensando en la seguridad y comodidad de las mascotas y los operarios.*

INTRODUCCIÓN

Circunstancias como el transporte, revisiones médicas, cirugías, profilaxis dentarias, entre otras generan estrés e incrementan la agresividad en animales susceptibles, dificultando su manejo, razón por la cual es indispensable contar con un tranquilizante que controle cada situación.

La Acepromazina es un neuroléptico de aceptación mundial en el manejo de mascotas.

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contienen	
Acepromazina maleato	1 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

DEL PRINCIPIO ACTIVO

Acepromazina maleato es derivado fenotiazínico que actúa como agente neuroléptico (calmante de la excitación o hiperactividad neuromuscular). Se sabe que la Fenotiazina bloquea los receptores dopamínicos post-sinápticos en el SNC y puede también inhibir la liberación e incrementar el retorno del porcentaje de dopamina.

Adicionalmente las Fenotiazinas presentan varios grados de efectos bloqueadores, anticolinérgicos, antihistamínicos, antiespasmódicos y antiadrenérgicos.

El principal efecto de la Acepromazina es el tranquilizante, pero además posee acción antiemética, antiespasmódica e hipotérmica.

Es metabolizada en el hígado y sus metabolitos son excretados por la orina.

DEL PRODUCTO

Sosegan®-*gotas* es una solución acuosa, debidamente estabilizada, que contiene como principio activo Acepromazina maleato.

Producto ideal para tranquilizar animales agresivos, especialmente a la hora de efectuar exámenes clínicos y durante el transporte. Se presenta en frasco gotero que permite una fácil administración.

CARACTERÍSTICAS

- El producto se presenta listo para su empleo.
- El frasco gotero plástico permite una fácil administración y dosificación.
- Acción rápida y segura.
- Permite el manejo de los animales para profilaxis dental.

Reg. ICA 6542 MV
INVET S.A.COLOMBIA
www.invetcolombia.com

INDICACIONES

Agente neuroléptico indicado en Perros y Gatos para el manejo de animales agresivos y nerviosos, así como agente antiemético. Empleado como ayuda para efectuar exámenes clínicos sin reacciones comportamentales adversas.
Gran ayuda para el transporte de animales, ya que los tranquiliza y evita el vómito.
Como agente preanestésico para mejorar, acrecentar y prolongar el efecto de los barbitúricos, reduciendo el requerimiento general de la anestesia y así mismo sus riesgos.
Util para disminuir el prurito en irritaciones de piel.

DOSIS

Perros: de 0.5 a 1 mg por kg de peso, que corresponde aproximadamente a *13 a 27 gotas por cada 10 kg de peso.*

Gatos: de 0.5 a 1 mg por kg de peso, que corresponde aproximadamente a *7 a 13 gotas por cada 5 kg de peso.*

- Para ulcera, placa y granuloma eosinofílico felino: 1 a 2 mg/kg (14 a 26 gotas/5 kg), cada 12 horas.

La dosis debe ser individualizada, dependiendo del grado de tranquilidad que se requiera. Iniciar administrando la menor cantidad con el objeto de establecer la dosis individual.

IMPORTANTE: La dosis requerida disminuye a medida que el peso del animal aumenta. Cuando el animal está en ayuno el efecto tranquilizante se presenta antes de 30 minutos; en caso contrario la dosis deberá aumentarse según criterio del Médico Veterinario.
En animales demasiado agresivos puede administrarse mezclado con el alimento. Normalmente la acción dura alrededor de dos horas pero, en algunos casos, puede prolongarse hasta cuatro horas.

CONTRAINDICACIONES:

- Las Fenotiazinas pueden potenciar la toxicidad de los organofosforados.
- No usar con Clorhidrato de procaina.
- La Epinefrina está contraindicada en el tratamiento de la hipotensión aguda, producida por Fenotiazinas.
- No administrar en perros Boxer por susceptibilidad al principio activo.

PRECAUCIONES

- Usar con precaución en animales con insuficiencia hepática o renal.
- Las Fenotiazinas pueden producir un descenso de la presión arterial, que no tiene mayor importancia; sin embargo, en casos extremos no deben emplearse adrenalina pues está contraindicado, en cuyo caso deben usarse otro agente hipertensor.

PRESENTACIÓN

Frasco gotero por 10 ml en caja individual.

BIBLIOGRAFÍA

3. BECALUBA, Mario. *"Técnicas Anestésicas en Grandes Animales".*Guía de estudios decirugía General. http://www.vet.unicen.edu.ar/html/Areas/cirugia%20general/Documentos/19-AnestesiaGdes Animales.pdf.
2. BEGERON, Renée; SCOTT, Shannon L. et al."*Physiology and behavior of dogs during airtransport*". The Canadian Journal of Vetenary Research. 2002;66:211-216.
3. THIBAUT, J., RIVERA T. y AHUMADA, F. "*Anestesia endovenosa en perros mediante el uso de propofol en dosis única, premedicado con acepromazina-atropina y xilazina-atropina*". *Arch.med.vet.*,2002, vol.34, no.1,p.25-35.ISSn 0301-732X.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario